

レジメンcode:	C35-49
適応がん種:	非小細胞肺癌
レジメン名:	PEM+CBDCA+Gefitinib
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PEM	ペムレキセド(アムタ)	500	mg/m ²	点滴(10分)	d1
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5	AUC	点滴(1時間)	d1
	ゲフィチニブ(イレッサ)	250	mg/body	内服(朝食後)	連日

*PEM+CBDCA+Gefitinib 最大6サイクル実施後、C35-50(PEM+Gefitinib)維持療法に移行すること。

ペムレキセド(アムタ)初回投与の1週間以上前～ペムレキセド(アムタ)最終投与日から22日目まで連日投与

- 1) パンビタン 1 g/day
内服 朝食後

ペムレキセド(アムタ)1週間以上前～ペムレキセド(アムタ)最終投与日から22日目まで9週ごとに1回

- 1) シアノコバラミン 1000 μg 1 A
筋注

day1【ケモセーフ使用】

- 1) アロカリス 235mg 1 V
パロノセトロン 0.75mg 1 V
デキサート 3.3mg 1.5 A
生食 50ml 1 本
主管① 点滴 30 分
- 2) ペムレキセド(アムタ) 500 mg/m² 【ケモセーフ使用】
生食 100ml 1 本
主管② 点滴 10分
- 3) カルボプラチン(パラプラチン) 5 AUC 【ケモセーフ使用】
生食 250ml 1 袋
主管③ 点滴 1時間
- 4) 生食 50ml 1 本
フラッシュ

〈所要時間 約2時間〉

連日

- 1) ゲフィチニブ(イレッサ) 250 mg/body
内服 朝食後