

レジメンcode:	C18-56	備考
適応がん種:	大腸癌	
レジメン名:	Pertuzumab+3wHER	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	パージェタ(初回)	840	mg/body	点滴(1時間)	
	(2回目以降)	420	mg/body	点滴(30分まで短縮可)	d1
HER	ハーセプチン(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1

day1

- | | | | | |
|--------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | | |
| | | | | ポート確認 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | | ルート確保 |
| 3) パージェタ | | 初回 | 840mg/body | |
| | | 2回目以降 | 420mg/body | |
| 生食 | 250ml | 1 袋 | | |
| | 主管① | 点滴 | 1時間 | 2回目以降は30分まで短縮可能 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 | (初回 1時間) 経過観察 |
| 5) ハーセプチン | | 初回 | 8mg/kg | |
| | | 2回目以降 | 6mg/kg | |
| 注射用水 | 100ml | 1 本 | | 60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。 |
| 生食 | 100ml | 1 本 | | 21mg/mlの溶解液になる。 |
| | 主管③ | 点滴 | 30 分 | (初回 90分) |
| 6) 生食 | 50ml | 1 本 | | フラッシュ |
| 7) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | | ルートロック |
- 〈所要時間 約2時間〉
〈初回 約4時間〉

次ページあり

【文献】

国内第Ⅱ相試験:EPOC1602試験【TRIUMPH試験】 Nat Med.2021;27:1899-1903. PMID 34764486

【適応】

*がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

*RAS遺伝子変異陽性の患者に対する本剤の有効性および安全性は確立していない。

*フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水和物による治療歴のない患者におけるパージェタ+ハーセプチン併用療法の有効性および安全性は確立していない。

*心機能検査:投与開始前に心エコー検査(LVEF)、心電図などにより心機能評価を行なった上で投与を検討する事。