

レジメンcode:	C50-45
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	フェスゴ配合皮下注
間隔:	3週間


備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	フェスゴ配合皮下注IN、MA[*1]			皮下注[*2]	d1

[*1]フェスゴ配合皮下注はIN(初回用量)、MA(維持用量)の2つの規格があります。

[*2]大腿部へ皮下投与すること。注射部位反応が報告されているので、同一箇所へ繰り返し注射することは避け、新たな注射部位は前回の注射部位から少なくとも2.5cm離すこと。〈図1参照〉

〈図1〉



*皮膚が敏感な部位や、皮膚に異常のある部位(傷、発疹、発赤、硬結等)は避けて下さい。

*フェスゴ投与時に翼状針の使用は推奨できません。

【皮下注射】初回投与時

- 1) フェスゴ配合皮下注IN 1 V
皮下注 大腿部に8分以上かけて投与する。
〈所要時間 ー 〉

【皮下注射】2回目以降

- 1) フェスゴ配合皮下注MA 1 V
皮下注 大腿部に5分以上かけて投与する。
〈所要時間 ー 〉

経過観察時間は初回投与時は30分、2サイクル目以降は、忍容性が良好であれば15分まで短縮できる。

【文献】

FeDeriCa試験:Lancet Oncol. 2021;22(1):85-97 (PMID:33357420)

【適応】

HER2陽性の乳癌

*術前及び術後療法では、術前4サイクル、術後療法として14サイクル(計1年間、18サイクル)投与する。

*予定されていた投与が前回投与日から6週間以上の時は、改めて初回投与量(IN)から開始する。

*フェスゴ投与中は、適宜心機能検査(心エコー等)を行うこと。

◎フェスゴ皮下注の注意事項

*本剤は「皮下投与製剤」のため静脈注射や点滴静脈内注射は行なわないこと。

*シリンジでの保管は、冷蔵庫(2℃～8℃)で24時間まで、室温(20℃～25℃)で4時間まで保管することができる。