

レジメンcode:	C53-07
適応がん種:	子宮頸癌
レジメン名:	TP(PTX3時間)
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
CDDP	シスプラチン(ブリプラチン)	50	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------|------------------|
| 1) ガスター | 20mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 3 V | |
| ポララミン | 5mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 2) アロカリス | 235mg | 1 V | |
| パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | | 175 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 インラインフィルター必須 |
| 4) 硫酸Mg補正液 | | 1 A | |
| 生食 | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管④ | 点滴 | 90分 |
| 5) 生食 | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 90分 |
| 6) シスプラチン(ブリプラチン) | | 50 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 500ml | 総液量650ml以下になるように生食を調製 | |
| | 主管⑥ | 点滴 | 2時間 |
| 7) マンニトールS | 300ml | 1 袋 | |
| | 主管⑦ | 点滴 | 1時間 |
| 8) ソルラクト | 1L | 1 袋 | |
| | 主管⑧ | 点滴 | 3時間 |
| 9) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |

ルートロック

〈所要時間 約13時間30分〉

次ページあり

day2、3

1) デキサート 生食	6.6mg 50ml 主管①	点滴	1 V 1 本 15 分
2) ソルラクト	1L 主管②	点滴	1 袋 4時間
3) ラクテック	500ml 主管③	点滴	1 袋 2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉