

レジメンcode:	C53-08
適応がん種:	子宮頸癌
レジメン名:	TP(PTX3時間)+Bv
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175	mg/m <sup>2</sup>	点滴(3時間)	d1
CDDP	シスプラチン(ブリプラチン)	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d2
Bv	アバスチン	15	mg/kg	点滴[*1]	d2

day1【ケモセーフ使用】

1) ガスター	20mg	1	A		
デキサート	6.6mg	3	V		
ポララミン	5mg	1	A		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	15	分	
2) 生食	50ml	1	本		
	主管②	点滴	30	分	
3) パクリタキセル(タキソール)		175	mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1	袋		
	主管③	点滴	3時間		インラインフィルター必須
4) 生食	50ml	1	本		
					フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒		
					ルートロック

〈所要時間 約4時間30分〉

次ページあり

day2【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液		1 A	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	2時間
2) 生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
3) アロカリス	235mg	1 V	
パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	30 分
4) シスプラチン(プリプラチン)		50 mg/m <sup>2</sup> 【ケモセーフ使用】	
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管④	点滴	2時間
5) マンニトールS	300ml	1 袋	
	主管⑤	点滴	1時間
6) ソルラクト	1L	1 袋	
	主管⑥	点滴	3時間
7) アバスチン		15 mg/kg	
生食	100ml	1 本	
	主管⑦	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分[*1]
8) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
9) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック
		〈所要時間	約11時間30分〉
		〈2回目	約12時間〉
		〈初回	約12時間30分〉

次ページあり

day3、4

1) デキサート	6.6mg	1 V
----------	-------	-----

生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉