

レジメンcode:	C18-39	備考
適応がん種:	大腸癌	
レジメン名:	Bv+FOLFOXIRI	
間隔:	2週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Bv	ペバシズマブ(アバスタチン)	5	mg/kg	点滴[*1]	d1
CPT-11	イリノテカン(トポテシン)	150	mg/m ²	点滴(90分)	d1
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	85	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)*2]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(48時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) 生食	50ml	1 本		
				ルート確保
3) ペバシズマブ(アバスタチン)		5 mg/kg		
生食	100ml	1 本		
	主管①	点滴	初回90分	
			2回目60分	
			3回目以降30分[*1]	
4) ホスアプレピタント	150mg	1 V		
生食	100ml	1 本		
	主管②	点滴	30分	
5) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ブスコパン	20mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管③	点滴	15 分	
6) イリノテカン(トポテシン)		150 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋		
	主管④	点滴	90分	

7) オキサリプラチン(エルプラット)		85 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋	
	主管⑤	点滴	2時間
8) レボホリナート		200 mg/m ²	
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋	
	▶側管①	点滴	2時間 主管⑤と同時に[*2]
9) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管⑥	点滴	48時間

〈所要時間 ー〉

day3

1) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
2) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 ー〉

【文献】

海外第Ⅲ相試験:【TRIBE試験】NEJM2014;371:1609 (PMID:25337750)

国内第Ⅱ相試験:【JACCRO CC-11試験】Oncotarget,2018,Vol.9,(No.27),pp:18811-18820 (PMID:29721163)

国内第Ⅰ相試験:Oncology 2012;82(4):242-248 (PMID:22508373)