

レジメンcode:	C18-40
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	Bv+FOLFOXIRI-IF(インフューザー)
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Bv	ベバシズマブ(アバスタ)	5	mg/kg	点滴[*1]	d1
CPT-11	イリノテカン(トホテシ)	150	mg/m ²	点滴(90分)	d1
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	85	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)*2]	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(48時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A			
					ポート確認
2) 生食	50ml	1 本			
					ルート確保
3) ベバシズマブ(アバスタ)			5 mg/kg		
生食	100ml	1 本			
	主管①	点滴		初回90分	
				2回目60分	
				3回目以降30分[*1]	
4) ホスアプレピタント	150mg	1 V			
生食	100ml	1 本			
	主管②	点滴		30分	
5) パロノセトロン	0.75mg	1 V			
デキサート	6.6mg	1 V			
デキサート	3.3mg	1 A			
ブスコパン	20mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管③	点滴		15 分	
6) イリノテカン(トホテシ)			150 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋			
	主管④	点滴		90分	

次ページあり

7) オキサリプラチン(エルプラット)		85 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋	
	主管⑤	点滴	2時間
8) レボホリナート		200 mg/m ²	
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋	
	▶側管①	点滴	2時間 主管⑤と同時に[*2]
9) 生食	50ml	1 本	
	主管⑥		フラッシュ
10) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m ²	
生食	100ml	総液量140ml になるように調製	
	主管⑦	点滴	48時間 (インフューザー)
〈所要時間 ー〉			
day3			
1) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック
〈所要時間 ー〉			

【文献】

海外第Ⅲ相試験:【TRIBE試験】NEJM2014;371:1609 (PMID:25337750)

国内第Ⅱ相試験:【JACCRO CC-11試験】Oncotarget,2018,Vol.9,(No.27),pp:18811-18820 (PMID:29721163)

国内第Ⅰ相試験:Oncology 2012;82(4):242-248 (PMID:22508373)