

レジメンcode:	C50-46
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	フェスゴ配合皮下注+3wDOC
間隔:	3週間


備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	フェスゴ配合皮下注IN、MA[*1]			皮下注[*2]	d1
DOC	ドセタキセル(タキソール)	60~75	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1

[\*1]フェスゴ配合皮下注はIN(初回用量)、MA(維持用量)の2つの規格があります。

[\*2]大腿部へ皮下投与すること。注射部位反応が報告されているので、同一箇所へ繰り返し注射することは避け、新たな注射部位は前回の注射部位から少なくとも2.5cm離すこと。〈図1参照〉

〈図1〉



\*皮膚が敏感な部位や、皮膚に異常のある部位(傷、発疹、発赤、硬結等)は避けて下さい。

\*フェスゴ投与時に翼状針の使用は推奨できません。

### 【皮下注射】初回投与时

- 1) フェスゴ配合皮下注IN 1 V  
皮下注 大腿部に8分以上かけて投与する。  
〈所要時間 ー 〉

### 【皮下注射】2回目以降

- 1) フェスゴ配合皮下注MA 1 V  
皮下注 大腿部に5分以上かけて投与する。  
〈所要時間 ー 〉

\*フェスゴ投与終了後、経過観察の時間を待ち、infusion reaction症状があらわれていないことを確認し、次の薬剤を投与して下さい。

経過観察時間は初回投与时は30分、2サイクル目以降は、忍容性が良好であれば15分まで短縮できる。


次ページあり

day1【ケモセーフ使用】

1) グラニセトロン	3mg	1 A
デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) ドセタキセル(タキソテル)		60～75 mg/m <sup>2</sup> 【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋
	主管②	点滴 1時間
3) 生食	50ml	1 本
		フラッシュ

〈所要時間 約1時間30分〉

【投与スケジュール】



● HER2陽性の乳癌における術前・術後薬物療法の  
場合：フェスゴの投与期間は12ヵ月までとする

【文献】

FeDeriCa試験:Lancet Oncol. 2021;22(1):85-97 (PMID:33357420)

【適応】

HER2陽性の乳癌

\*術前及び術後療法では、術前4サイクル、術後療法として14サイクル(計1年間、18サイクル)投与する。

\*予定されていた投与が前回投与日から6週間以上の時は、改めて初回投与量(IN)から開始する。

\*フェスゴ投与中は、適宜心機能検査(心エコー等)を行うこと。

◎フェスゴ皮下注の注意事項

\*本剤は「皮下投与製剤」のため静脈注射や点滴静脈内注射は行なわないこと。

\*シリンジでの保管は、冷蔵庫(2℃～8℃)で24時間まで、室温(20℃～25℃)で4時間まで保管することができる。

