

レジメンcode:	C61-06
適応がん種:	前立腺癌
レジメン名:	3wDOC+ADT+ダロルタミド
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
DOC	ドセタキセル(タキソール)[*1]	75	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
ADT	アンドロゲン除去療法[*2]				
	ニューベクオ[*3]	1200	mg/日	1日2回食後	連日
PSL	プレドニゾン[*4]	10	mg/日	1日1回又は1日2回	連日

[*1]ドセタキセルは最大6サイクルまで投与。ADT、ニューベクオは継続。

[*2]ADT(androgen-deprivation therapy):GnRHアゴニスト/アンタゴニスト又は精巣摘除術。用法用量は各薬剤添付文書参照。

[*3]不整脈等の心臓障害があらわれることがあるので、本剤投与開始前及び本剤投与中は適宜心機能検査(心電図等)を行なうなど、状態を十分に確認すること。

[*4]医師の判断でプレドニゾンの併用投与が可能。

day1【ケモセーフ使用】

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) ドセタキセル(タキソール)		75 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋	
	主管②	点滴	1時間
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約2時間〉

連日

1) ニュベクオ		1200 mg/日	
		内服	1日2回食後

[*4]連日

1) プレドニゾン	5mg	2 錠/day	
	内服	1日1回 又は1日2回	

【文献】

国際共同第Ⅲ相試験【ARASENS試験】N Engl J Med 2022;386:1132-42(PMID:35179323)

*適応:遠隔転移を有する前立腺癌