

レジメンcode:	C65-06	備考
適応がん種:	上部尿路癌(術後補助)	
レジメン名:	Nivolumab(2週間)	
間隔:	2週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与方法	投与日
	オプジーボ	240	mg/body	点滴(30分)	d1

*術後補助療法における投与期間は12ヶ月間までとする。

day1

1) 生食	50ml	1本	ルート確保		
2) オプジーボ		240 mg/body			
生食	100ml	1本	(フィルター必須)		
	主管①	点滴	30分	30分以上かけて投与すること	
3) 生食	50ml	1本	フラッシュ用		
〈所要時間 約1時間〉					

【文献】

国際共同第Ⅲ相試験【CheckMate274(ONO-4538-33/CA209274)試験 NEJM2021;384:2102-14(PMID:34077643)

【適応】尿路上皮癌における術後補助療法

*PD-L1 発現の有無は問わない。

【臨床試験での対象患者】

- ①シスプラチンを含む術前化学療法を受け、術後の病理組織学的診断結果がypT2-ypT4a又はypN+の患者。
- ②シスプラチンを含む術前化学療法を受けておらず、術後の病理組織学的診断結果がpT3-pT4a又はpN+であり、かつシスプラチンを含む術後補助化学療法が不適応または当該治療を拒否した患者。

*甲状腺機能障害、下垂体機能障害及び副腎障害があらわれる事があるため、投与開始前及び投与期間中は定期的に内分泌機能検査を実施すること。

◎検査セット登録あり: 場所 カルテ→(検体)→(特殊セット)→(免疫チェックポイント初回)(免疫チェックポイント2回目～)

*インラインフィルター(0.2~5μm)を使用する。

*有害事象(肺、肝、内分泌障害、皮膚、胃腸、腎、神経関連など)対処アルゴリズムを参照する。

*臨床試験での検査スケジュール、投与延期または休業基準を参照する。