

| | |
|-----------|----------|
| レジメンcode: | C53-02 |
| 適応がん種: | 子宮頸癌 |
| レジメン名: | PTX+CDDP |
| 間隔: | 3週間 |

| |
|----|
| 備考 |
| |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|------|----------------|-----|-------------------|----------|-----|
| PTX | パクリタキセル(タキソール) | 135 | mg/m ² | 点滴(24時間) | d1 |
| CDDP | シスプラチン(プリプラチン) | 50 | mg/m ² | 点滴(2時間) | d2 |

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

| | | | | | |
|-------------------|-------|-----|-------------------|---|--------------|
| 1) ガスター | 20mg | 1 | A | | |
| デキサート | 6.6mg | 3 | V | | |
| ポララミン | 5mg | 1 | A | | |
| 生食 | 50ml | 1 | 本 | | |
| | 主管① | 点滴 | 15 | 分 | |
| 2) 生食 | 50ml | 1 | 本 | | |
| | 主管② | 点滴 | 30 | 分 | |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | | 135 | mg/m ² | | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 | 袋 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 24時間 | | インラインフィルター必須 |
| | | | | | 〈所要時間 -〉 |

次ページあり

day2【ケモセーフ使用】

| | | | | |
|-------------------|--------|----|-----------------------|-----------|
| 1) 硫酸Mg補正液 | | | 1 A | |
| 生食 | 500ml | | 1 袋 | |
| | 主管① | 点滴 | 2時間 | 前日の主管に続いて |
| 2) 生食 | 500ml | | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 2時間 | |
| 3) アロカリス | 235mg | | 1 V | |
| パロノセトロン | 0.75mg | | 1 V | |
| デキサート | 6.6mg | | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | | 1 A | |
| 生食 | 50ml | | 1 本 | |
| | 主管③ | 点滴 | 30 分 | |
| 4) シスプラチン(プリプラチン) | | | 50 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 500ml | | 総液量650ml以下になるように生食を調製 | |
| | 主管④ | 点滴 | 2時間 | |
| 5) マンニトールS | 300ml | | 1 袋 | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 1時間 | |
| 6) ソルラクト | 1L | | 1 袋 | |
| | 主管⑥ | 点滴 | 3時間 | |
| 7) ヘパリンNaロック | 10ml | | 1 筒 | |
| | | | | ルートロック |

〈所要時間 -〉

day3、4

| | | | | |
|--------------|-------|----|------|--------|
| 1) デキサート | 6.6mg | | 1 V | |
| 生食 | 50ml | | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 | |
| 2) 硫酸Mg補正液 | | | 1 A | |
| ソルラクト | 1L | | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 4時間 | |
| 3) ラクテック | 500ml | | 1 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 2時間 | |
| 4) ヘパリンNaロック | 10ml | | 1 筒 | |
| | | | | ルートロック |

〈所要時間 約7時間〉