

レジメンcode:	C56-05
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	TC
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175~180	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5~6	AUC	点滴(1時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|--------------------|--------|---------------------------|------------------|
| 1) ガスター | 20mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 3 V | |
| ポララミン | 5mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 2) アロカリス | 235mg | 1 V | |
| パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | | 175~180 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 インラインフィルター必須 |
| 4) カルボプラチン(パラプラチン) | | 5~6 AUC | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食 | 250ml | 1 袋 | |
| | 主管④ | 点滴 | 1時間 |
| 5) 生食 | 50ml | 1 本 | |

フラッシュ

〈所要時間 約5時間30分〉