

レジメンcode:	C56-13
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	DP+Bev
間隔:	3週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
DOC	ドセタキセル(タキソテル)	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1
CDDP	シスプラチン(アリプラチン)	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1
Bv	ベバシズマブ(アバスチン)	15	mg/kg	点滴[*1]	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液			1 A		
生食	500ml		1 袋		
	主管①	点滴		2時間	
2) 生食	500ml		1 袋		
	主管②	点滴		2時間	
3) アロカリス	235mg		1 V		
パロノセトロン	0.75mg		1 V		
デキサート	6.6mg		1 V		
デキサート	3.3mg		1 A		
生食	50ml		1 本		
	主管③	点滴		30 分	
4) ドセタキセル(タキソテル)			70 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml		1 袋		
	主管④	点滴		1時間	
5) シスプラチン(アリプラチン)			60 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	500ml			総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管⑤	点滴		2時間	
6) マンニトールS	300ml		1 袋		
	主管⑥	点滴		1時間	
7) ソルラクト	1L		1 袋		
	主管⑦	点滴		3時間	
8) ベバシズマブ(アバスチン)			15 mg/kg		
生食	100ml		1 本		
	主管⑧	点滴		初回90分	
				2回目60分	
				3回目以降30分[*1]	

次ページあり

9) 生食	50ml		1 本
		点滴	フラッシュ
10) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒
ルートロック			

〈所要時間 約12時間30分〉  
 〈2回目 約13時間〉  
 〈初回 約13時間30分〉

day2

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒
ルートロック			

〈所要時間 約6時間30分〉

day3

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間

〈所要時間 約6時間30分〉