

レジメンcode:	C56-15
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	DP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
DOC	ドセタキセル(タキソテル)	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

- |                   |        |                       |                      |           |
|-------------------|--------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 1) 硫酸Mg補正液        |        |                       | 1 A                  |           |
| 生食                | 500ml  |                       | 1 袋                  |           |
|                   | 主管①    | 点滴                    |                      | 2時間       |
| 2) 生食             | 500ml  |                       | 1 袋                  |           |
|                   | 主管②    | 点滴                    |                      | 2時間       |
| 3) アロカリス          | 235mg  |                       | 1 V                  |           |
| パロノセトロン           | 0.75mg |                       | 1 V                  |           |
| デキサート             | 6.6mg  |                       | 1 V                  |           |
| デキサート             | 3.3mg  |                       | 1 A                  |           |
| 生食                | 50ml   |                       | 1 本                  |           |
|                   | 主管③    | 点滴                    |                      | 30 分      |
| 4) ドセタキセル(タキソテル)  |        |                       | 70 mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5%           | 250ml  |                       | 1 袋                  |           |
|                   | 主管④    | 点滴                    |                      | 1時間       |
| 5) シスプラチン(プリプラチン) |        |                       | 60 mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】 |
| 生食                | 500ml  | 総液量650ml以下になるように生食を調製 |                      |           |
|                   | 主管⑤    | 点滴                    |                      | 2時間       |
| 6) マンニトールS        | 300ml  |                       | 1 袋                  |           |
|                   | 主管⑥    | 点滴                    |                      | 1時間       |
| 7) ソルラクト          | 1L     |                       | 1 袋                  |           |
|                   | 主管⑦    | 点滴                    |                      | 3時間       |
| 8) ヘパリンNaロック      | 10ml   |                       | 1 筒                  |           |

ルートロック

〈所要時間 約12時間〉

次ページあり

day2

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml		1 筒

ルートロック

〈所要時間 約6時間30分〉

day3

1) デキサート	6.6mg		1 V
生食	50ml		1 本
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液			1 A
ソルラクト	1L		1 袋
	主管②	点滴	4時間
3) ラクテック	500ml		1 袋
	主管③	点滴	2時間

〈所要時間 約6時間30分〉