

レジメンcode:	C56-16
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	CBDCA + GEM + Bv
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	4	AUC	点滴(1時間)	d1
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8
Bv	ベバシズマブ(アバスタ)	15	mg/kg	点滴[*1]	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) アロカリス	235mg	1 V	
パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1.5 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	30 分
2) カルボプラチン(パラプラチン)		4 AUC	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋	
	主管②	点滴	1時間
3) ゲムシタビン		1000 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本	
	主管③	点滴	30 分
4) ベバシズマブ(アバスタ)		15 mg/kg	
生食	100ml	1 本	
	主管④	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分[*1]
5) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約3時間〉
 〈2回目 約3時間30分〉
 〈初回 約4時間〉

day8【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) ゲムシタビン		1000 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約1時間30分〉