

レジメンcode:	C56-17
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	CBDCA+GEM
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	4	AUC	点滴(1時間)	d1
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8

day1【ケモセーフ使用】

1) アロカリス	235mg	1	V		
パロノセトロン	0.75mg	1	V		
デキサート	3.3mg	1.5	A		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	30分		
2) カルボプラチン(パラプラチン)		4	AUC	【ケモセーフ使用】	
生食	250ml	1	袋		
	主管②	点滴	1時間		
3) ゲムシタビン		1000	mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
生食	100ml	1	本		
	主管③	点滴	30分		
4) 生食	50ml	1	本		
				フラッシュ	
				〈所要時間	約2時間30分〉

day8【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1	V		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	15分		
2) ゲムシタビン		1000	mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
生食	100ml	1	本		
	主管②	点滴	30分		
3) 生食	50ml	1	本		
				フラッシュ	
				〈所要時間	約1時間30分〉