

レジメンcode:	C56-18
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	DC+Bv
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
DOC	ドセタキセル(タキソテル)	70	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5	AUC	点滴(1時間)	d1
Bv	ベバシズマブ(アバスタ)	15	mg/kg	点滴[*1]	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) アロカリス	235mg	1	V	
パロノセトロン	0.75mg	1	V	
デキサート	3.3mg	1.5	A	
生食	50ml	1	本	
	主管①	点滴	30分	
2) ドセタキセル(タキソテル)		70	mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1	袋	
	主管②	点滴	1時間	
3) カルボプラチン(パラプラチン)		5	AUC	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1	袋	
	主管③	点滴	1時間	
4) ベバシズマブ(アバスタ)		15	mg/kg	
生食	100ml	1	本	
	主管④	点滴	初回90分	
			2回目60分	
			3回目以降30分[*1]	
5) 生食	50ml	1	本	

フラッシュ

〈所要時間	約3時間30分〉
〈2回目	約4時間〉
〈初回	約4時間30分〉