

レジメンcode:	C90-07
適応がん種:	多発性骨髄腫
レジメン名:	VMP療法(皮下注)
間隔:	6週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
BOR	ボルテゾミブ(ベルケイト [®])(1~4クール)	1.3	mg/m ²	皮下注	d1.4.8.11.22.25.29.32
	(5~9クール)	1.3	mg/m ²	皮下注	d1.8.22.29
	アルケラン	9	mg/m ²	内服(朝食前)	d1~4
	プレドニゾン	60	mg/m ²	内服(朝昼食後)	d1~4

d1、4、8、11、22、25、29、32(1~4クール)

- 1) ボルテゾミブ(ベルケイト[®]) 1.3 mg/m²
 生食 1.2ml
 皮下注 1.2ml/1V 溶解後必要量調製
 〈所要時間 ー〉

d1、8、22、29(5~9クール)

- 1) ボルテゾミブ(ベルケイト[®]) 1.3 mg/m²
 生食 1.2ml
 皮下注 1.2ml/1V 溶解後必要量調製
 〈所要時間 ー〉

d1~4

- 1) アルケラン 9 mg/m²
 内服 朝食前
- 2) プレドニゾン 60 mg/m²
 内服 朝昼食後

連日

- 1) バクタ 1 錠/day
 アシクロビル 200mg 1 錠/day
 内服 朝食後

ニューモシスチス肺炎、帯状疱疹の発症予防のため上記薬剤の内服が推奨されている