レジメンcode:	C90-09
適応がん種:	多発性骨髄腫
レジメン名:	CyBorD療法(皮下注)
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
BOR	ボルテゾミブ(ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ)	1.3	mg/㎡	皮下注	d1、4、8、11
CPA	エンドキサン	300	mg/㎡	内服(朝夕食後)	d1、8、15、22
	レナデックス	40	mgbody	内服(朝食後)	d1～4、9～12、17～20

d1、4、8、11

1) ボルテゾミブ(ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ) 1.3 mg/㎡

生食 1.2ml

皮下注 1.2ml/1V 溶解後必要量調製

〈所要時間 ー 〉

day1、8、15、22

1) エンドキサン(50mg/1錠) 300 mg/㎡

内服 朝夕食後

day1～4、9～12、17～20

1) レナデックス 4mg 10 錠/day

内服 朝食後

連日

1) バクタ 1 錠/day

アシクロビル 200mg 1 錠/day

内服 朝食後

ニューモシスチス肺炎、帯状疱疹の発症予防のため上記薬剤の内服が推奨されている