

レジメンcode:	C56-12
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	TC+Bv
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	6	AUC	点滴(1時間)	d1
Bv	ベバシズマブ(アバステン)	15	mg/kg	点滴[*1]	d1

day1 【ケモセーフ使用】

1) ファモチジン	20mg	1	A	
デキサート	6.6mg	3	V	
ポララミン	5mg	1	A	
生食	50ml	1	本	
	主管①	点滴	15	分
2) アロカリス	235mg	1	V	
パロノセトロン	0.75mg	1	V	
生食	50ml	1	本	
	主管②	点滴	30	分
3) パクリタキセル(タキソール)		175	mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1	袋	
	主管③	点滴	3時間	インラインフィルター必須
4) カルボプラチン(パラプラチン)		6	AUC	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1	袋	
	主管④	点滴	1時間	
5) ベバシズマブ(アバステン)		15	mg/kg	
生食	100ml	1	本	
	主管⑤	点滴	初回90分	
			2回目60分	
			3回目以降30分[*1]	
6) 生食	50ml	1	本	
			フラッシュ	

〈所要時間	約5時間30分〉
〈2回目	約6時間〉
〈初回	約6時間30分〉