

レジメンcode:	C49-11	備考
適応がん種:	肉腫(ユーイング肉腫)	
レジメン名:	IE(VDC-IE交替療法)	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
IFM	イホマイド	1800	mg/m ²	点滴(1時間)	d1~5
VP-16	エトポシド	100	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~5

*C49-10: VDC(ADM:総投与量が375mg/m²に達したら、C49-12:VACへ移行する)と、C49-11:IEを3週間ごと交互に投与し、4サイクル終了後に局所療法(手術士放射線治療)を加え、合計17サイクルで終了。

*VDC1回目を1サイクル、IE1回目を2サイクル、VDC2回目を3サイクル…、としてサイクルは数える。

day1【ケモセーフ使用】

1) メイロン	20ml	1 A	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	2時間
2) ホスアプレピタント	150mg	1 V	
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30分
3) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	15分
4) エトポシド		100 mg/m ²	
生食	500ml	1 本	
	主管④	点滴	2時間 【ケモセーフ使用】
5) ウロミテキサン		360 mg/m ²	
	主管	静注	1日3回 緩徐に
	イホマイド投与直前、投与4時間後、投与8時間後		
6) イホマイド		1800 mg/m ²	
生食	100ml	1 本	
	主管⑤	点滴	1時間 【ケモセーフ使用】
7) メイロン	20ml	1 A	
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本	
	主管⑥~⑨	点滴	それぞれ2時間で
8) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
	ルートロック		

〈所要時間 約14時間〉

次ページあり

day2～5【ケモセーフ使用】

1) メイロン	20ml	1 A
生食	500ml	1 袋
	主管①	点滴 2時間
2) グラニセトロン	3mg	1 A
デキサート	6.6mg	1 V
デキサート	3.3mg	1 A
生食	50ml	1 本
	主管②	点滴 15 分
3) エトポシド	100 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 本
	主管③	点滴 2時間
4) ウロミテキサン	360 mg/m ²	
	主管	静注 1日3回 緩徐に
		イホマイド投与直前、投与4時間後、投与8時間後
5) イホマイド	1800 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本
	主管④	点滴 1時間
6) メイロン	20ml	1 A
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本
	主管⑤～⑧	点滴 それぞれ2時間で
7) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック

〈所要時間 約14時間〉

day6

1) ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本
	主管①	点滴 2時間
2) メイロン	20ml	1 A
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 袋
	主管②	点滴 2時間
3) ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本
	主管③	点滴 2時間
4) メイロン	20ml	1 A
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本
	主管④	点滴 2時間

〈所要時間 約8時間30分〉

【文献】

国際共同第Ⅲ相試験【N Engl J Med 2003;348:694-701 (PMID:12594313)】

【適応】

(臨床試験) : ユーイング肉腫、骨の未分化神経外胚葉性腫瘍、未分化骨肉腫