

レジメンcode:	C49-12	備考
適応がん種:	肉腫(ユーイング肉腫)	
レジメン名:	VAC(VDC-IE交替療法)	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VCR	オンコビン	[*1]2	mg/m ²	点滴(全開)	d1
CPA	エンドキサン	1200	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
ACT-D	コスメゲン	1.25	mg/m ²	点滴(全開)	d1

*C49-10: VDC(ADM:総投与量が375mg/m²に達したら、C49-12:VACへ移行する)と、C49-11:IEを3週間ごと交互に投与し、4サイクル終了後に局所療法(手術±放射線治療)を加え、合計17サイクルで終了。

*VDC1回目を1サイクル、IE1回目を2サイクル、VDC2回目を3サイクル・・・としてサイクルは数える。

day1【ケモセーフ使用】

1) メイロン	20ml	1 A		
生食	500ml	1 袋		
	主管①	点滴	2時間	
2) ホスアプレピタント	150mg	1 V		
生食	100ml	1 本		
	主管②	点滴	30分	
3) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管③	点滴	15 分	
4) オンコビン		2 mg/m ²	[*1]最大2mg	
生食	50ml	1 本		
	主管④	点滴	全開	【ケモセーフ使用】
5) ウロミテキサン		240 mg/m ²		
	主管	静注	1日3回	緩徐に
				エンドキサン投与直前、投与4時間後、投与8時間後
6) エンドキサン		1200 mg/m ²		
生食	250ml	1 袋		
	主管⑤	点滴	1時間	【ケモセーフ使用】
7) コスメゲン		1.25 mg/m ²		
注射用水	20ml	1 A		1.1ml/Vの注射用水で溶解
生食	50ml	1 本		0.5mg/mlの溶解液
	主管⑥	点滴	全開	【ケモセーフ使用】

8) メイロン	20ml	1 A	
ソルデム3A(ソリター-T3)	500ml	1 本	
	主管⑦～⑩ 点滴	それぞれ2時間で	
9) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
		ルートロック	
〈所要時間 約13時間〉			

day2

1) ソルデム3A(ソリター-T3)	500ml	1 本	
	主管① 点滴	2時間	
2) メイロン	20ml	1 A	
ソルデム3A(ソリター-T3)	500ml	1 袋	
	主管② 点滴	2時間	
3) ソルデム3A(ソリター-T3)	500ml	1 本	
	主管③ 点滴	2時間	
4) メイロン	20ml	1 A	
ソルデム3A(ソリター-T3)	500ml	1 本	
	主管④ 点滴	2時間	
〈所要時間 約8時間30分〉			

【文献】

国際共同第Ⅲ相試験【N Engl J Med 2003;348:694-701 (PMID:12594313)】

【適応】

(臨床試験): ユーイング肉腫、骨の未分化神経外胚葉性腫瘍、未分化骨肉腫