

レジメンcode:	C35-16	備考
適応がん種:	非小細胞肺癌	
レジメン名:	CBDCA+wPTX	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1.8.15
CBDCA	カルボプラチナ(パラプラチナ)	5~6	AUC	点滴(1時間)	d1

#### day1【ケモセーフ使用】

1) ファモチジン	20mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
ポララミン	5mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) アロカリス	235mg	1 V	
パロノセトロン	0.75mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) パクリタキセル(タキソール)	70 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】	
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋	
	主管③	点滴	1時間 インラインフィルター必須
4) カルボプラチナ(パラプラチナ)	5~6 AUC	【ケモセーフ使用】	
生食	250ml	1 袋	
	主管④	点滴	1時間
5) 生食	50ml	1 本	
		フラッシュ	

〈所要時間 約3時間30分〉

day8、15【ケモセーフ使用】

1) ファモチジン	20mg	1 A
デキサート	6.6mg	1 V
デキサート	3.3mg	1 A
ポララミン	5mg	1 A
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) 生食	50ml	1 本
	主管②	点滴 30 分
3) パクリタキセル(タキソール)	70 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋
	主管③	点滴 1時間 インラインフィルター必須
4) 生食	50ml	1 本
		フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉