

レジメンcode:	C50-23	備考
適応がん種:	乳癌	
レジメン名:	PTX+Bev	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	80	mg/m ²	点滴(1時間)	d1、8、15
Bev	ベバシズマブ(アバスチン)	10	mg/kg	点滴[*1]	d1、15

day1、15【ケモセーフ使用】

- 1) ファモチジン 20mg 1 A
 デキサート 6.6mg 1 V
 デキサート 3.3mg 1 A
 ポララミン 5mg 1 A
 生食 50ml 1 本
 主管① 点滴 15 分
-
- 2) 生食 50ml 1 本
 主管② 点滴 30 分
-
- 3) パクリタキセル(タキソール) 80 mg/m² 【ケモセーフ使用】
 ブドウ糖液5% 250ml 1 袋
 主管③ 点滴 1時間 インラインフィルター必須
-
- 4) 生食 50ml 1 本
 主管④ 点滴 15分
-
- 5) ベバシズマブ(アバスチン) 10 mg/kg
 生食 100ml 1 本
 主管⑤ 点滴 初回90分
 2回目60分
 3回目以降30分[*1]
-
- 6) 生食 50ml 1 本

フラッシュ

〈所要時間	約3時間〉
〈2回目	約3時間30分〉
〈初回	約4時間〉

day8【ケモセーフ使用】

1) ファモチジン	20mg	1 A
デキサート	6.6mg	1 V
デキサート	3.3mg	1 A
ポララミン	5mg	1 A
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) 生食	50ml	1 本
	主管②	点滴 30 分
3) パクリタキセル(タキソール)	80 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋
	主管③	点滴 1時間 インラインフィルター必須
4) 生食	50ml	1 本
		フラッシュ

〈所要時間 約2時間〉