

レジメンcode:	C56-22	備考
適応がん種:	卵巣癌	
レジメン名:	wPTX+Bv	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	60~70	mg/m ²	点滴(1時間)	d1、8、15、22
Bv	ベバシズマブ(アバスチン)	10	mg/kg	点滴[*1]	d1、15

day1、15【ケモセーフ使用】

1) ファモチジン	20mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
ポララミン	5mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) 生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) パクリタキセル(タキソール)	60~70 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋	
	主管③	点滴	1時間 インラインフィルター必須
4) 生食	50ml	1 本	
	主管④	点滴	15分
5) ベバシズマブ(アバスチン)	10 mg/kg		
生食	100ml	1 本	
	主管⑤	点滴	初回90分
			2回目60分
			3回目以降30分[*1]
6) 生食	50ml	1 本	

フラッシュ

〈所要時間 約3時間〉
 〈2回目 約3時間30分〉
 〈初回 約4時間〉

次ページあり

day8、22 【ケモセーフ使用】

1) フアモチジン	20mg	1 A
デキサート	6.6mg	1 V
デキサート	3.3mg	1 A
ポララミン	5mg	1 A
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) 生食	50ml	1 本
	主管②	点滴 30 分
3) パクリタキセル(タキソール)	60~70 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋
	主管③	点滴 1時間 インラインフィルター必須
4) 生食	50ml	1 本
		フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉