

レジメンcode:	C76-01
適応がん種:	原発不明がん
レジメン名:	TC療法
間隔:	3週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175～200	mg/m <sup>2</sup>	点滴(3時間)	d1
CBDCA	カルボプラチナ(パラプラチナ)	5～6	AUC	点滴(1時間)	d1

### day1【ケモセーフ使用】

1) ファモチジン デキサート ポララミン 生食	20mg 6.6mg 5mg 50ml	1 A 3 V 1 A 1 本	パクリタキセルの投与1時間～1時間30分前に アプレビタント(イメント)125mg内服
2) パロノセトロン 生食	0.75mg 50ml	1 V 1 本	
	主管①	点滴 15 分	
3) パクリタキセル(タキソール)	175～200 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】	
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管③	点滴 3時間	インラインフィルター必須
4) カルボプラチナ(パラプラチナ) 生食	5～6 AUC 250ml	【ケモセーフ使用】 1 袋	
	主管④	点滴 1時間	
5) 生食	50ml	1 本	フラッシュ
			〈所要時間 約5時間30分〉

### day2,3

アプレビタント(イメント)	80 mg
	内服 朝食後