

レジメンcode:	C50-30	備考
適応がん種:	乳癌	
レジメン名:	Pertuzumab+HER+wPTX	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	パージェタ(初回)	840	mg/body	点滴(1時間)	
	(2回目以降)	420	mg/body	点滴(30分まで短縮可)	d1
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1
PTX	パクリタキセル(タキソール)	80	mg/m ²	点滴(1時間)	d1、8、15

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|--------------------|-------|------------|-------------------------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | |
| | | | ポート確認 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | ルート確保 |
| 3) パージェタ | 初回 | 840mg/body | |
| | 2回目以降 | 420mg/body | |
| 生食 | 250ml | 1 袋 | |
| | 主管① | 点滴 | 1時間 2回目以降は30分まで短縮可能 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 (初回 1時間) 経過観察 |
| 5) トラスツズマブ(ハーセプチン) | 初回 | 8mg/kg | |
| | 2回目以降 | 6mg/kg | |
| 注射用水 | 100ml | 1 本 | 60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。 |
| 生食 | 100ml | 1 本 | 21mg/mlの溶解液になる。 |
| | 主管③ | 点滴 | 30 分 (初回 90分) |
| 6) ファモチジン | 20mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| ポララミン | 5mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管④ | 点滴 | 15 分 |
| 7) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 30 分 |

次ページあり

8) パクリタキセル(タキソール)		80 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管⑥	点滴	1時間	インラインフィルター必須
9) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
10) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック
			〈所要時間	約4時間〉
			〈初回	約6時間〉

day8、15【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) ファモチジン	20mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) 生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	30 分	
4) パクリタキセル(タキソール)		80 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
5) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック
			〈所要時間	約2時間30分〉