

| | | |
|-----------|--------------|----|
| レジメンcode: | C35-22 | 備考 |
| 適応がん種: | 非小細胞肺癌 | |
| レジメン名: | PTX+CBDCA+Bv | |
| 間隔: | 3週間 | |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|-------|-----------------|-----|-------------------|---------|-----|
| PTX | パクリタキセル(タキソール) | 200 | mg/m ² | 点滴(3時間) | d1 |
| CBDCA | カルボプラチナ(パラプラチナ) | 6 | AUC | 点滴(1時間) | d1 |
| Bv | ベバシズマブ(アバストチン) | 15 | mg/kg | 点滴[*1] | d1 |

day1【ケモセーフ使用】

| | | | | |
|--------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|
| 1) ファモチジン | 20mg | 1 A | | |
| デキサート | 6.6mg | 3 V | | |
| ポララミン | 5mg | 1 A | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 | |
| 2) アロカリス | 235mg | 1 V | | |
| パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 | |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | | 200 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 | |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 袋 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 | インラインフィルター必須 |
| 4) カルボプラチナ(パラプラチナ) | | 6 AUC | 【ケモセーフ使用】 | |
| 生食 | 250ml | 1 袋 | | |
| | 主管④ | 点滴 | 1時間 | |
| 5) ベバシズマブ(アバストチン) | | 15 mg/kg | | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 初回90分 | |
| | | | 2回目60分 | |
| | | | 3回目以降30分[*1] | |
| 6) 生食 | 50ml | 1 本 | | |

フラッシュ

| | |
|-------|----------|
| 〈所要時間 | 約6時間〉 |
| 〈2回目 | 約6時間30分〉 |
| 〈初回 | 約7時間〉 |