

レジメンcode:	C56-26	備考
適応がん種:	卵巣癌	
レジメン名:	weeklyTC	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1、8、15
CBDCA	カルボプラチニ	2	AUC	点滴(1時間)	d1、8、15

\*臨床試験では6コース施行

#### day1、8、15【ケモセーフ使用】

1) ファモチジン	20mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15分	
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	30分	
3) パクリタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	【ケモセーフ使用】		
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
4) カルボプラチニ	2 AUC	【ケモセーフ使用】		
生食	250ml	1 袋		
	主管④	点滴	1時間	
5) 生食	50ml	1 本		

フラッシュ

〈所要時間 約3時間〉

#### 【文献】

海外第Ⅲ相試験(MITO-7試験)Lancet Oncol 2014;15:396-405;(PMID:24582486)