

レジメンcode:	C85-29	備考
適応がん種:	悪性リンパ腫	
レジメン名:	Adcetris	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴	d1

### day1【ケモセーフ使用】

- |           |           |           |                           |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1) 生食     | 50ml      | 1 本       | ルート確保                     |
| 2) アドセトリス |           | 1.8 mg/kg | 1Vあたり10.5mlの注射用水で溶解       |
| 注射用水      | 100ml     | 1 本       | 5mg/mlの溶解液になる             |
| 生食        | [*1]100ml | 1 本       | [*1]160mg以上の場合、250mlへ変更する |
|           | 主管①       | 点滴        | 30分 【ケモセーフ使用】             |
| 3) 生食     | 50ml      | 1 本       | フラッシュ                     |
- 〈所要時間 約1時間〉

(アドセトリス)

\*希釈後の最終濃度が0.4~1.2mg/mlになるように調製する。

\*160mg以上投与する場合は希釈液を250mlへ增量する必要あり。

\*体重が100kgを超える場合は100kgとして計算する。

\*希釈後速やかに投与しない場合は、2~8°Cで保存し、溶解後から24時間以内に投与すること。