

レジメンcode:	C56-30	備考
適応がん種:	卵巣癌	
レジメン名:	3wPTX+Bv	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
Bv	ベバシズマブ(アバスチン)	15	mg/kg	点滴[*1]	d1

day1 【ケモセーフ使用】

1) ファモチジン	20mg	1 A	
デキサート	6.6mg	3 V	
ポララミン	5mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) 生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) パクリタキセル(タキソール)	175 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	3時間 インラインフィルター必須
4) 生食	50ml	1 本	
	主管④	点滴	15 分
5) ベバシズマブ(アバスチン)	15 mg/kg		
生食	100ml	1 本	
	主管⑤	点滴	初回90分
			2回目60分
			3回目以降30分[*1]
6) 生食	50ml	1 本	

フランシュ

〈所要時間	約5時間
〈2回目	約5時間30分
〈初回	約6時間