

レジメンcode:	C85-31
適応がん種:	ホジキンリンパ腫
レジメン名:	アドセトリス+AVD
間隔:	4週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
ADM	ドキソルビシン(アドリアシン)	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開)	d1、15
VLB	エクザール	6[*1]	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開)	d1、15
DTIC	ダカルバジン	375	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)[*2]	d1、15
	アドセトリス	1.2	mg/kg	点滴(30分)	d1、15

\*最大12回(6サイクル)まで投与

★ADM 総投与量 500mg/m<sup>2</sup>以下

#### day1、15【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン	0.75mg	1 V	ドキソルビシンの投与1時間～1時間30分前に アプレピタント(イメント)125mg内服
デキサート	3.3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
		主管① 点滴 15 分	
2) ドキソルビシン(アドリアシン)		25 mg/m <sup>2</sup>	
生食	50ml	1 本	
		主管② 点滴 全開	【ケモセーフ使用】
3) エクザール		6 mg/m <sup>2</sup>	最大10mg[*1]
生食	50ml	1 本	
		主管③ 点滴 全開	【ケモセーフ使用】
4) ダカルバジン		375 mg/m <sup>2</sup>	
生食	100ml	1 本	【ケモセーフ使用】
		主管④ 点滴 30分	点滴経路全体を遮光[*2]
5) 生食	50ml	1 本	
		主管⑤ 点滴 15分	
6) アドセトリス		1.2 mg/kg	1Vあたり10.5mlの注射用水で溶解
注射用水	100ml	1 本	5mg/mlの溶解液になる
生食	[*1]100ml	1 本	[*1]160mg以上の場合、250mlへ変更する
		主管⑥ 点滴 30分	【ケモセーフ使用】
7) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
			〈所要時間 約2時間30分〉

#### day2,3

アプレピタント(イメント)	80 mg
内服	朝食後

(アドセトリス)

\*希釈後の最終濃度が0.4～1.2mg/mlになるように調製する。

\*160mg以上投与する場合は希釈液を250mlへ增量する必要あり。

\*体重が100kgを超える場合は100kgとして計算する。

\*希釈後速やかに投与しない場合は、2～8°Cで保存し、溶解後から24時間以内に投与すること。