

レジメンcode:	C53-02	備考
適応がん種:	子宮頸癌	
レジメン名:	PTX+CDDP	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	135	mg/m ²	点滴(24時間)	d1
CDDP	シスプラチナ(ブリプラチナ)	50	mg/m ²	点滴(2時間)	d2

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| 1) ファモチジン | 20mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 3 V | |
| ポララミン | 5mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | 135 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 | |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 24時間 インラインフィルター必須 |
| | | | 〈所要時間 - 〉 |

day2【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液		1 A
生食	500ml	1 袋
	主管①	点滴 2時間 前日の主管に続いて
2) 生食	500ml	1 袋
	主管②	点滴 2時間
3) アロカリス	235mg	1 V
パロノセトロン	0.75mg	1 V
デキサート	6.6mg	1 V
デキサート	3.3mg	1 A
生食	50ml	1 本
	主管③	点滴 30 分
4) シスプラチニン(ブリプラチニ)		50 mg/m ² 【ケモセーフ使用】
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製
	主管④	点滴 2時間
5) マンニットールS	300ml	1 袋
	主管⑤	点滴 1時間
6) ソルラクト	1L	1 袋
	主管⑥	点滴 3時間
7) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック
		〈所要時間 - 〉

day3、4

1) デキサート		1 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) 硫酸Mg補正液		1 A
ソルラクト	1L	1 袋
	主管②	点滴 4時間
3) ラクテック	500ml	1 袋
	主管③	点滴 2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック
		〈所要時間 約7時間〉