

| | | |
|-----------|--------|----|
| レジメンcode: | C16-02 | 備考 |
| 適応がん種: | 胃癌 | |
| レジメン名: | wPTX | |
| 間隔: | 4週間 | |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|-----|----------------|-----|-------------------|---------|-----------|
| PTX | パクリタキセル(タキソール) | 80 | mg/m ² | 点滴(1時間) | day1、8、15 |

day1、8、15【ケモセーフ使用】

| | | | |
|-------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 1) ファモチジン | 20mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| ポララミン | 5mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | 80 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 | |
| ブドウ糖液5% | 250ml | 1 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 1時間 インラインフィルター必須 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | フラッシュ | |

〈所要時間 約2時間〉