

レジメンcode:	C50-03	備考
適応がん種:	乳癌	
レジメン名:	wPTX+wHER	
間隔:	1週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	80	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	4	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	2	mg/kg	点滴(30分)	d1

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|--------------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| 1) ファモチジン | 20mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| ポララミン | 5mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | | 80 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 250ml | 1 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 1時間 インラインフィルター必須 |
| 4) トラスツズマブ(ハーセプチン) | 初回 | 4mg/kg | |
| | 2回目以降 | 2mg/kg | |
| 注射用水 | 100ml | 1 本 | 60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。 |
| 生食 | 100ml | 1 本 | 21mg/mlの溶解液になる。 |
| | 主管④ | 点滴 | 30 分 (初回 90分) |
| 5) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |
| | | | 〈所要時間 約2時間30分〉 |
| | | | 〈初回 約3時間30分〉 |