

レジメンcode:	C50-49	備考
適応がん種:	乳癌	
レジメン名:	Sacituzumab Govitecan	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	トロデルビ	10	mg/kg	点滴[*1]	d1、8

day1、8

1) カロナール	500mg	1錠 内服	トロデルビ投与30分前
----------	-------	----------	-------------

*infusion reactionを軽減させるため、トロデルビ投与30分前に上記の薬剤の内服を行なう事

day1、8【ケモセーフ使用】

1) アロカリス	235mg	1V
パロノセトロン	0.75mg	1V
ファモチジン	20mg	1A
デキサート	6.6mg	1V
デキサート	3.3mg	1A
ポララミン	5mg	1A
生食	50ml	1本
	主管①	点滴 30分 内服前投薬確認

2) 生食	50ml	1本
	主管②	点滴 15分

3) トロデルビ	10 mg/kg	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1本 要遮光
	主管③	点滴 3時間 [*1]2回目以降は1時間まで短縮可能

4) 生食	50ml	1本
	主管④	点滴 30分

〈所要時間 約2時間30分〉

〈初回 約4時間30分〉

【文献】

海外第Ⅲ相試験【IMMU-132-05試験/ASCENT試験 N Engl J Med.2021 Apr 22;384(16) (PMID:33882206)】

【適応】

化学療法歴(タキサン系抗悪性腫瘍剤)のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

*調製後、輸液バッグを遮光すること

*希釈後、遮光下2~8°Cで保存し24時間以内に使用すること。ただし、常温に戻した後、8時間以内に投与完了すること。