

レジメンcode:	C50-50	備考
適応がん種:	乳癌	
レジメン名:	Datopotamab Deruxtecan	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	ダトロウェイ	6 mg/kg		点滴[*1]	d1

day1

1) カロナール 500mg 1錠

内服 ダトロウェイ投与30分前

*infusion reactionを軽減させるため、ダトロウェイ投与30分前に上記の薬剤の内服を行なう事

day1【ケモセーフ使用】

1) アロカリス	235mg	1 V	
パロノセトロン	0.75mg	1 V	
ガスター	20mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
ポララミン	5mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴 30分	内服前投薬確認
2) ブドウ糖液5%	50ml	1 本	
	主管②	点滴 15分	
3) ダトロウェイ	6 mg/kg	【ケモセーフ使用】	
注射用水	100ml	1本	1Vあたり注射用水5mlで溶解
ブドウ糖液5%	100ml	1本	点滴バッグを遮光し、4時間以内に投与終了すること インラインフィルター必須
	主管③	点滴 90分	[*1]2回目以降は30分まで短縮可能
4) ブドウ糖液5%	50ml	1 本	
	主管④	点滴 30分	

〈所要時間 約2時間〉

〈初回 約3時間〉

【文献】

国際共同第Ⅲ相試験【TROPION-Breast01試験 J Clin Oncol 43: 285-296 (PMID:39265124)】

【適応】

化学療法歴(アントラサイクリン系又はタキサン系抗悪性腫瘍剤)のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

次ページあり

*角膜障害が出現する可能性がある(臨床試験発現状況:18.6%)

- ・予防のため、防腐剤・粘稠剤を含まない点眼薬(市販薬:ソフトサンティア、なみだロートファイブなど)を毎日複数回(1日6回程度)使用すること。
- ・原則としてコンタクトレンズの使用を控えること。
- ・人工涙液以外の点眼薬の使用は、眼科専門医等の判断を仰ぐこと。

*調製後、輸液バッグを遮光すること

*希釈後、遮光下2~8°Cで保存し24時間以内に使用すること。室温での調製及び投与は合わせて4時間以内に行うこと。