

レジメンcode:	C85-44	備考
適応がん種:	悪性リンパ腫	
レジメン名:	Pola-R-CHP	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1[*3][*4]
Pola	ポライバー	1.8	mg/kg	点滴[*2]	d2[*4]
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(1時間)	d2[*4]
ADM	ドキソルビシン(アドリアシン)	50	mg/m ²	点滴(全開)	d2[*4]
PSL	プレドニゾロン	100	mg/body	内服	d2~6[*4]

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

[*3]Pola-R-CHP6コース施行後、リツキシマブ単剤投与を2コース追加する。

[*4]1コース目はinfusion reaction発現を考慮し、リツキシマブとポライバーの同日投与は避け、day1R単剤、day2ポライバー+CHP投与とし、2コース目から同日投与(1日投与法)を行なうこともできる。

[【2日投与法】](#)と[【1日投与法】](#)はPDF3ページ、4ページ目を参照すること。

連日[*5]

バクタ	1 錠/day
アシクロビル	200mg 1 錠/day
内服	朝食後

[*5]ニューモシスチス肺炎、帯状疱疹の発症予防のため上記薬剤の内服が推奨されている。

【1コース目】

day1、2

1) カロナール	200mg	2 錠
ベポタスチンOD	10mg	1 錠
内服		

*day1 リツキシマブ投与30分前、day2 ポライバー投与30分前に内服

day2~6

1) プレドニゾロン	100 mg/body
内服	朝昼食後

day1

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釀
	主管①	点滴	初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる
			2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) 生食	50ml	1 本	フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	ルートロック

〈所要時間 約6時間〉

day2【ケモセーフ使用】

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬確認 ルート確保
2) ポライビー		1.8 mg/kg	【ケモセーフ使用】
大塚蒸留水	100ml	1 本	
生食	100ml	1 本	(インラインフィルター必須)
	主管①	点滴	初回90分 2回目以降30分[*2]
3) 生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	30分 経過観察
4) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	15 分
5) エンドキサン		750 mg/m ²	
生食	250ml	1 袋	
	主管④	点滴	1時間 【ケモセーフ使用】
6) ドキソルビシン(アドリアシン)		50 mg/m ²	
生食	50ml	1 本	
	主管⑤	点滴	全開 【ケモセーフ使用】
7) 生食	50ml	1 本	

フラッシュ

〈所要時間 初回約4時間〉

2回目～約3時間〉

【2~6コース目】

★Pola-R-CHP(2日法)と(1日法)を記載しています。スクロールしてご参照下さい。

(2日法) day1-リツキシマブ単剤、day2-ポライビー+CHP

day1、2

1) カロナール	200mg	2錠
ベポタスチンOD	10mg	1錠
内服		

*day1 リツキシマブ投与30分前、day2 ポライビー投与30分前に内服

day2~6

1) プレドニゾロン	100 mg/body
内服	朝昼食後

day1

1) 生食	50ml	1本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釀
	主管①	点滴	初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる
			2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) 生食	50ml	1本	
			フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml	1筒	
			ルートロック

〈所要時間 約6時間〉

day2【ケモセーフ使用】

1) 生食	50ml	1本	内服前投薬確認 ルート確保
2) ポライビー		1.8 mg/kg	【ケモセーフ使用】
大塚蒸留水	100ml	1本	
生食	100ml	1本	(インラインフィルター必須)
	主管①	点滴	30分
3) 生食	50ml	1本	
	主管②	点滴	30分 経過観察
4) グラニセトロン	3mg	1A	
生食	50ml	1本	
	主管③	点滴	15分

5) エンドキサン	750 mg/m ²		
生食	250ml	1 袋	
	主管④	点滴	1時間 【ケモセーフ使用】
6) ドキソルビシン(アドリアシン)	50 mg/m ²		
生食	50ml	1 本	
	主管⑤	点滴	全開 【ケモセーフ使用】
7) 生食	50ml	1 本	
	フラッシュ		

〈所要時間 初回約4時間〉

2回目～約3時間〉

(1日法)

day1

1) カロナール	200mg	2 錠	
ベポタスチンOD	10mg	1 錠	
	内服	リツキシマブ投与30分前	

day1～5

1) プレドニゾロン	100 mg/body		
	内服	朝昼食後	

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)	375 mg/m ²		
生食	500ml	生食で10倍に希釀 主管① 点滴 初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]	
3) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	主管② 点滴 15分
4) 生食	50ml	1 本	主管③ 点滴 15分
5) ポライビー	1.8 mg/kg 【ケモセーフ使用】		
大塚蒸留水	100ml	1 本	
生食	100ml	1 本	(インラインフィルター必須)
	主管④ 点滴	30分[*2]	

6) 生食	50ml	1 本
	主管⑤	点滴 15分
7) エンドキサン		750 mg/m ²
生食	250ml	1 袋
	主管⑥	点滴 1時間 【ケモセーフ使用】
8) ドキソルビシン(アドリアシン)		50 mg/m ²
生食	50ml	1 本
	主管⑦	点滴 全開 【ケモセーフ使用】
9) 生食	50ml	1 本
		フラッシュ

〈所要時間 約7時間30分〉

【7、8コース目】

day1

1) カロナール	200mg	2 錠
ペポタスチンOD	10mg	1 錠
内服		リツキシマブ投与30分前

day1

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釀
	主管①	点滴	初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]

フラッシュ

〈所要時間 約6時間〉

【文献】

国際共同第Ⅲ相試験【GO39942試験(POLARIX試験) NEJM2022;386:351-63 PMID:34904799】

【適応】

未治療のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫

*抗ウイルス薬及び抗ニューモシスチス薬予防投与を考慮する。

*各サイクルの治療薬投与において、G-CSF製剤の予防投与を行う。(POLARIX試験)

【ポライバー】

*インラインフィルター(0.2又は0.22 μm)を使用する。

[*2]初回投与は90分かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間を30分間まで短縮できる。