

レジメンcode:	C85-46
適応がん種:	悪性リンパ腫
レジメン名:	RT-2/3DeVIC
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CBDCA	カルボプラチナ(パラプラチナ)	200	mg/m ²	点滴(30分)	d1
VP-16	エトポシド	67	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~3
IFM	イホマイド	1000	mg/m ²	点滴(3時間)	d1~3
DEX	デキサメタゾン	33	mg/body	点滴(15分)	d1~3
RT		1.8~2.0	Gy	計 50~50.4Gy	

day1【ケモセーフ使用】

- 1) ホスアプレビント 150mg
生食 100ml 1本
主管① 点滴 30分
-
- 2) パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
生食 50ml 1本
主管② 点滴 15分
-
- 3) カルボプラチナ(パラプラチナ) 200 mg/m² 【ケモセーフ使用】
生食 250ml 1袋
主管③ 点滴 30分
-
- 4) エトポシド 67 mg/m² 【ケモセーフ使用】
生食 500ml 1袋
主管④ 点滴 2時間
-
- 5) メイロン 20ml 1A
生食 500ml 1袋
主管⑤ 点滴 2時間
-
- 6) ウロミテキサン 200 mg/m²
主管 静注 1日3回
イホマイド投与直前、投与4時間後、投与8時間後
-
- 7) 生食 50ml 1本 【ケモセーフ使用】
▶側管① ルート確保
-
- 8) イホマイド 1000 mg/m² 【ケモセーフ使用】
生食 250ml 1本
▶側管② 点滴 3時間 主管⑤と同時に
-
- 9) 生食 50ml 1本
▶側管③ フラッシュ

10) メイロン	20ml	1 A
ソルデム3A(ツリタ-T3)	500ml	1 本
	主管⑥～⑨ 点滴	それぞれ2時間で
11) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒

ルートロック

〈所要時間 約13時間30分〉

day2、3【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	5 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) エトポシド		67 mg/m ²
生食	500ml	1 袋
	主管②	点滴 2時間
3) メイロン	20ml	1 A
生食	500ml	1 袋
	主管③	点滴 2時間
4) ウロミテキサン		200 mg/m ²
	主管	静注 1日3回
		イホマイド投与直前、投与4時間後、投与8時間後
5) 生食	50ml	1 本 【ケモセーフ使用】
	▶側管①	ルート確保
6) イホマイド		1000 mg/m ² 【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 本
	▶側管②	点滴 3時間 主管③と同時に
7) 生食	50ml	1 本
	▶側管③	フラッシュ
8) メイロン	20ml	1 A
ソルデム3A(ツリタ-T3)	500ml	1 本
	主管④～⑦ 点滴	それぞれ2時間で
9) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒

ルートロック

〈所要時間 約12時間30分〉

day4

1) デキサート 生食	6.6mg 50ml	1 V 1 本
	主管①	点滴 15 分
2) ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 袋
	主管②	点滴 2時間
3) メイロン ソルデム3A(ソリタ-T3)	20ml 500ml	1 A 1 袋
	主管③	点滴 2時間
4) ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本
	主管④	点滴 2時間
5) メイロン ソルデム3A(ソリタ-T3)	20ml 500ml	1 A 1 本
	主管⑤	点滴 2時間

〈所要時間 約8時間30分〉

【文献】

国内多施設共同第 I / II 相試験[JCOG0211-D1]J Clin Oncol 27:5594–5600(PMID:19805668)

【適応】

節外性NK/T細胞リンパ腫、鼻型(未治療限局期)

【臨床試験】

*3週間毎、3サイクルまで実施

*白血球<2,000/ μ L あるいは 好中球<1,000/ μ L の時、G-CSF製剤投与。(白血球 \geq 5,000/ μ Lになつたら中止)

【イホマイド】

①ポリカーボネート製三方活栓不可

②室温で6時間以内、冷所保存で24時間以内に使用すること