

レジメンcode:	C85-47	備考
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫	
レジメン名:	R-COP(1日法)	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
VCR	オンコビン	1.4[*2]	mg/m ²	点滴(全開)	d1
PSL	プレドニゾロン	100	mg/body	内服	d1~5

day1

1) カロナール	200mg	2 錠	
ベポタスチンOD	10mg	1 錠	
	内服	リツキシマブ投与30分前	

day1~5

1) プレドニゾロン	100 mg/body
	内服 朝昼食後

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)	375 mg/m ²		
生食	500ml		生食で10倍に希釈
	主管①	点滴	初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる
			2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	15 分 【ケモセーフ使用】
4) エンドキサン	750 mg/m ²		
生食	250ml	1 袋	
	主管③	点滴	1時間 【ケモセーフ使用】
5) オンコビン	1.4 mg/m ²	最大2mg[*2]	
生食	50ml	1 本	
	主管④	点滴	全開 【ケモセーフ使用】
6) 生食	50ml	1 本	
			ルートフラッシュ

〈所要時間 約7時間30分〉