

レジメンcode:	C85-48
適応がん種:	悪性リンパ腫
レジメン名:	アドセトリス+CHP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
ADM	ドキソルビシン(アトリアシン)	50	mg/m ²	点滴(全開)	d1
	アドセトリス	1.8	mg/kg	点滴(30分)	d1
PSL	プレドニゾロン	100	mg/body	内服	d1~5

* 最大8回まで投与

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1~5

1) プレドニゾロン 100 mg/body
内服 朝昼食後

day1【ケモセーフ使用】

1) グラニセトロン 3mg 1 A
生食 50ml 1 本
主管① 点滴 15 分

2) エンドキサン 750 mg/m²
生食 250ml 1 袋
主管② 点滴 1時間 【ケモセーフ使用】

3) ドキソルビシン(アトリアシン) 50 mg/m²
生食 50ml 1 本
主管③ 点滴 全開 【ケモセーフ使用】

4) 生食 50ml 1 本
主管④ 点滴 15分

5) アドセトリス 1.8 mg/kg 1Vあたり10.5mlの注射用水で溶解
注射用水 100ml 1 本 5mg/mlの溶解液になる
生食 [*1]100ml 1 本 [*1]160mg以上の場合、250mlへ変更する
主管⑤ 点滴 30分 【ケモセーフ使用】

6) 生食 50ml 1 本
フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

【文献】

国際共同第Ⅲ相試験【SGN35-014試験(ECHELON-2) Lancet.2019 Jan 19;393(10168):229–240 (PMID:30522922)】

【適応】

(臨床試験) : 未治療のCD30陽性の末梢性T細胞性リンパ腫

(アドセトリス)

*希釈後の最終濃度が0.4～1.2mg/mlになるように調製する。

*160mg以上投与する場合は希釈液を250mlへ增量する必要あり。

*体重が100kgを超える場合は100kgとして計算する。

*希釈後速やかに投与しない場合は、2～8°Cで保存し、溶解後から24時間以内に投与すること。