

レジメンcode:	C18-53	備考
適応がん種:	大腸癌	
レジメン名:	BV+ロンサーフ	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
BV	ベバシズマブ(アバスチン)	5	mg/kg	点滴[*1]	day1、15
	ロンサーフ	[*2]	mg	内服(朝夕食後)	day1夕～6朝、8夕～13朝

*day1にロンサーフを休薬する場合、**ベバシズマブ単独投与は行わない。**
投与サイクルを遅らせベバシズマブをロンサーフの投与と同時に再開する。

*day1にベバシズマブを休薬する場合、day15にベバシズマブ単独投与を行うことは可能。

day1、15

- | | | | |
|------------------|-------|--------------|---------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | ポート確認 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | ルート確保 |
| 3) ベバシズマブ(アバスチン) | | 5 mg/kg | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | |
| 主管① | 点滴 | 初回90分 | |
| | | 2回目60分 | |
| | | 3回目以降30分[*1] | |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | フラッシュ |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | ルートロック |
| | | | 〈所要時間 約1時間〉 |
| | | | 〈2回目 約1時間30分〉 |
| | | | 〈初回 約2時間〉 |

day1夕～6朝、8夕～13朝

- | | |
|----------|---------|
| 1) ロンサーフ | [*2] mg |
| | 内服 朝夕食後 |

[*2]初回基準量(1回用量)を体表面積に合わせて投与する。2ページ目図参照。

朝食後及び夕食後の1日2回、5日間連続経口投与したのち2日間休薬する。

体表面積 (m ²)	初回基準量 【トリフルリジン相当量】
1.07未満	35 mg/回 (70 mg/日)
1.07以上～1.23未満	40 mg/回 (80 mg/日)
1.23以上～1.38未満	45 mg/回 (90 mg/日)
1.38以上～1.53未満	50 mg/回 (100 mg/日)
1.53以上～1.69未満	55 mg/回 (110 mg/日)
1.69以上～1.84未満	60 mg/回 (120 mg/日)
1.84以上～1.99未満	65 mg/回 (130 mg/日)
1.99以上～2.15未満	70 mg/回 (140 mg/日)
2.15以上	75 mg/回 (150 mg/日)

初回基準量 (mg/日)	1回用量* (mg) および服用錠数		
	朝食後 ☼	夕食後 ☽	
70	35	35	
80	40	40	
90	45	45	
100	50	50	
110	55	55	
120	60	60	
130	65	65	
140	70	70	
150	75	75	

減量基準	
好中球数	500/mm ³ 未満
血小板数	50000/mm ³ 未満

*コース単位で1日単位量として **10mg/日単位で減量** すること

*ただし、最低投与量は30mg/日までとする