

レジメンcode:	C35-05	備考
適応がん種:	非小細胞肺癌	
レジメン名:	CBDCA+PTX	
間隔:	3~4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	200	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
CBDCA	カルボプラチナ(パラプラチナ)	6	AUC	点滴(1時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) ファモチジン	20mg	1 A	
デキサート	6.6mg	3 V	
ポララミン	5mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) アロカリス	235mg	1 V	
パロノセトロン	0.75mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) パクリタキセル(タキソール)	200 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	3時間 インラインフィルター必須
4) カルボプラチナ(パラプラチナ)	6 AUC	【ケモセーフ使用】	
生食	250ml	1 袋	
	主管④	点滴	1時間
5) 生食	50ml	1 本	
		フラッシュ	

〈所要時間 約5時間30分〉