

レジメンcode:	C49-05
適応がん種:	肉腫
レジメン名:	IFM+PTX
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	135	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
IFM	イホマイド	1600	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~3

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食 20ml 1 A
 ポート確認

2) ファモチジン 20mg 1 A
 デキサート 6.6mg 3 V
 ポララミン 5mg 1 A
 生食 50ml 1 本
 主管① 点滴 15 分

3) グラニセトロン 3mg 1 A
 生食 50ml 1 本
 主管② 点滴 30 分

4) パクリタキセル(タキソール) 135 mg/m² 【ケモセーフ使用】
 ブドウ糖液5% 500ml 1 袋
 主管③ 点滴 3時間 インラインフィルター必須

5) メイロン 20ml 1 A
 生食 500ml 1 袋
 主管④ 点滴 2時間

6) 生食 50ml 1 本
 ▶側管① ルート確保

7) イホマイド 1600 mg/m² 【ケモセーフ使用】
 生食 250ml 1 本
 ▶側管② 点滴 2時間 主管④と同時に

8) ウロミテキサン 320 mg/m²
 ▶側管 静注 1日3回
 IFM投与直前、投与4時間後、投与8時間後

9) メイロン 20ml 1 A
 ソルデム3A(ソリタ-T3) 500ml 1 本
 主管⑤~⑧ 点滴 それぞれ2時間で

10) ヘパリンNaロック 10ml 1 筒
 ルートロック

〈所要時間 約14時間30分〉

次ページあり

day2、3【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	ポート確認
2) メイロン	20ml	1 A	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	2時間
3) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15 分
4) イホマイド		1600 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 本	
	▶側管②	点滴	2時間 側管①に続いて
5) ウロミテキサン		320 mg/m ²	
	▶側管	静注	1日3回
			IFM投与直前、投与4時間後、投与8時間後
6) メイロン	20ml	1 A	
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本	
	主管②～⑤	点滴	それぞれ2時間で
7) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約10時間30分〉

day4

1) 生食	20ml	1 A	ポート確認
2) ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本	
	主管①	点滴	2時間
3) メイロン	20ml	1 A	
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
4) ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本	
	主管③	点滴	2時間
5) メイロン	20ml	1 A	
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本	
	主管④	点滴	2時間
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約8時間30分〉

*IFM

①ポリカーボネート製三方活栓不可

②室温で6時間以内、冷所保存で24時間以内