

レジメンcode:	C99-08
適応がん種:	骨髄異形成症候群
レジメン名:	アザシチジン(点滴静注)
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	アザシチジン(ビダーザ)	75	mg/m ²	点滴(10分)	d1～7

day1～6【ケモセーフ使用】

1) グラニセトロン	3mg	1	A		
デキサート	6.6mg	1	V		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	15	分	
2) アザシチジン(ビダーザ)		75	mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
注射用水		100	ml	アザシチジン溶解用	
生食	50ml	1	本	調製後1時間以内に投与終了すること	
	主管②	点滴	10	分	
3) 生食	50ml	1	本		
				フラッシュ	
4) ヘパフラッシュ	10ml	1	筒		
				ルートロック	

〈所要時間 約 45分〉

day7【ケモセーフ使用】

1) グラニセトロン	3mg	1	A		
デキサート	6.6mg	1	V		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	15	分	
2) アザシチジン(ビダーザ)		75	mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
注射用水		100	ml	アザシチジン溶解用	
生食	50ml	1	本	調製後1時間以内に投与終了すること	
	主管②	点滴	10	分	
3) 生食	50ml	1	本		
				フラッシュ	

〈所要時間 約 45分〉

・減量基準あり。