

レジメンcode:	C53-06	備考
適応がん種:	子宮頸癌	
レジメン名:	TC+Bev	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175	mg/m <sup>2</sup>	点滴(3時間)	d1
CBDCA	カルボプラチナ(パラプラチナ)	5	AUC	点滴(1時間)	d1
Bv	アバスチン	15	mg/kg	点滴[*1]	d1

#### day1【ケモセーフ使用】

- 1) ファモチジン 20mg 1 A  
 デキサート 6.6mg 3 V  
 ポララミン 5mg 1 A  
 生食 50ml 1 本  
 \_\_\_\_\_  
 主管① 点滴 15 分
- 2) アロカリス 235mg 1 V  
 パロノセトロン 0.75mg 1 V  
 生食 50ml 1 本  
 \_\_\_\_\_  
 主管② 点滴 30 分
- 3) パクリタキセル(タキソール) 175 mg/m<sup>2</sup> 【ケモセーフ使用】  
 ブドウ糖液5% 500ml 1 袋  
 \_\_\_\_\_  
 主管③ 点滴 3時間 インラインフィルター必須
- 4) カルボプラチナ(パラプラチナ) 5 AUC 【ケモセーフ使用】  
 生食 250ml 1 袋  
 \_\_\_\_\_  
 主管④ 点滴 1時間
- 5) アバスチン 15 mg/kg  
 生食 100ml 1 本  
 \_\_\_\_\_  
 主管⑤ 点滴 初回90分  
 2回目60分  
 3回目以降30分[\*1]
- 6) 生食 50ml 1 本

フラッシュ

〈所要時間 約5時間30分〉  
 〈2回目 約6時間〉  
 〈初回 約6時間30分〉