

レジメンcode:	C53-07	備考
適応がん種:	子宮頸癌	
レジメン名:	TP(PTX3時間)	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
CDDP	シスプラチニ(ブリプラチニ)	50	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

- 1) フアモチジン 20mg 1 A
 デキサート 6.6mg 3 V
 ポララミン 5mg 1 A
 生食 50ml 1 本
 主管① 点滴 15 分
-
- 2) アロカリス 235mg 1 V
 パロノセトロン 0.75mg 1 V
 生食 50ml 1 本
 主管② 点滴 30 分
-
- 3) パクリタキセル(タキソール) 175 mg/m² 【ケモセーフ使用】
 ブドウ糖液5% 500ml 1 袋
 主管③ 点滴 3時間 インラインフィルター必須
-
- 4) 硫酸Mg補正液 1 A
 生食 500ml 1 袋
 主管④ 点滴 90分
-
- 5) 生食 500ml 1 袋
 主管⑤ 点滴 90分
-
- 6) シスプラチニ(ブリプラチニ) 50 mg/m² 【ケモセーフ使用】
 生食 500ml 総液量650ml以下になるように生食を調製
 主管⑥ 点滴 2時間
-
- 7) マンニットールS 300ml 1 袋
 主管⑦ 点滴 1時間
-
- 8) ソルラクト 1L 1 袋
 主管⑧ 点滴 3時間
-
- 9) ヘパリンNaロック 10ml 1 筒

ルートロック

〈所要時間 約13時間30分〉

次ページあり

day2、3

1) デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) ソルラクト	1L	1 袋
	主管②	点滴 4時間
3) ラクテック	500ml	1 袋
	主管③	点滴 2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉