

レジメンcode:	C49-07
適応がん種:	肉腫
レジメン名:	Trabectedin
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	ヨンデリス	1.2	mg/m ²	点滴(24時間)	d1

*起壊死性抗がん剤のため**中心静脈**より投与する。

*溶解後30時間以内に投与を終了する。

*他の薬剤との配合または同じ静脈ラインでの同時注入を避けること。

*中等度催吐性リスク、肝保護作用のため、デキサメタゾンリン酸エステルNaとして20mg/body投与する。

***横紋筋融解症**があらわれることがあるので、筋肉痛、脱力感等の症状を観察するとともに、本剤投与開始前及び投与中は**定期的にCKの検査を行う**など、患者の状態を十分に観察すること。

*心機能障害があらわれることがあるので、**本剤投与開始前及び投与中は定期的に心エコー等の心機能検査**

(左室駆出率の測定を含む)を行うとともに、心機能障害に関連する臨床的な徵候や症状を十分に観察すること。

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A	ポート確認
2) パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	2 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) 生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
4) ヨンデリス		1.2 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 本	
	主管③	点滴	24時間
5) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約25時間30分〉