

レジメンcode:	C53-08	備考
適応がん種:	子宮頸癌	
レジメン名:	TP(PTX3時間) + Bv	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
CDDP	シスプラチナ(ブリプラチナ)	50	mg/m ²	点滴(2時間)	d2
Bv	アバスチン	15	mg/kg	点滴[*1]	d2

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| 1) ファモチジン | 20mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 3 V | |
| ポララミン | 5mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | 175 mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 | |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 インラインフィルター必須 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | フラッシュ | |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | ルートロック | |

〈所要時間 約4時間30分〉

day2【ケモセーフ使用】

1) 硫酸Mg補正液		1 A	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	2時間
2) 生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
3) アロカリス	235mg	1 V	
パロノセトロン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	30 分
4) シスプラチニン(ブリプラチニ)		50 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管④	点滴	2時間
5) マンニットールS	300ml	1 袋	
	主管⑤	点滴	1時間
6) ソルラクト	1L	1 袋	
	主管⑥	点滴	3時間
7) アバスチン		15 mg/kg	
生食	100ml	1 本	
	主管⑦	点滴	初回90分 2回目60分 3回目以降30分[*1]
8) 生食	50ml	1 本	
		フラッシュ	
9) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
		ルートロック	
		〈所要時間	約11時間30分〉
		〈2回目	約12時間〉
		〈初回	約12時間30分〉

次ページあり

day3、4

1) デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) ソルラクト	1L	1 袋
	主管②	点滴 4時間
3) ラクテック	500ml	1 袋
	主管③	点滴 2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉