

レジメンcode:	C65-08	備考
適応がん種:	上部尿路癌	
レジメン名:	wPTX	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1、8、15

day1、8、15【ケモセーフ使用】

- |                   |                      |           |                  |
|-------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 1) ファモチジン         | 20mg                 | 1 A       |                  |
| デキサート             | 6.6mg                | 1 V       |                  |
| デキサート             | 3.3mg                | 1 A       |                  |
| ポララミン             | 5mg                  | 1 A       |                  |
| 生食                | 50ml                 | 1 本       |                  |
|                   | 主管①                  | 点滴        | 15 分             |
| 2) 生食             | 50ml                 | 1 本       |                  |
|                   | 主管②                  | 点滴        | 30 分             |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | 80 mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】 |                  |
| ブドウ糖液5%           | 250ml                | 1 袋       |                  |
|                   | 主管③                  | 点滴        | 1時間 インラインフィルター必須 |
| 4) 生食             | 50ml                 | 1 本       |                  |
|                   |                      | フラッシュ     |                  |

〈所要時間 約2時間30分〉

平成26年2月24日厚生労働省「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて」の通知において、「パクリタキセルを「尿路上皮癌(腎機能障害がある場合又は二次化学療法として使用される場合に限る)」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める」とされている。